



2096 Red Arrow Trail
Madison, WI 53711
608-275-6740

Croup (Tos Ferina)

Aviso de Enfermedad Contagiosa

Estimados Padres:

Es posible que su hijo/a haya sido expuesto a la enfermedad contagiosa **Croup (Tos Ferina)** en un salón de clase de Reach Dane/Reach Green en el día _____.

Por favor, revise la información abajo. Si usted tiene cualquier pregunta, o si su hijo/a experimenta síntomas de la enfermedad, por favor hable con el proveedor de salud primaria de su hijo/a o una de las agencias indicadas abajo.

Salud Publica – Madison & Dane County

(608) 266-4821

Departamento de Salud de Green County

(608) 328-9390

¿Qué es la Tos Ferina?

La Tos Ferina es un problema respiratorio común en los niños pequeños. Su síntoma principal es una toz dura, ladradora. Un ataque de toz ferina puede dar miedo, pero es raramente seria. Usualmente los niños se mejoran en algunos días con descanso y cuidados en casa.

La Tos Ferina usualmente ocurre unos cuantos días después de un resfriado común y usualmente es causada por los mismos virus que causan un resfriado. Los gérmenes que causan esto pueden ser pasados de una persona a otra por medio de toz, estornudos, y contacto cercano.

¿Cuáles son los síntomas de la Tos Ferina?

Los síntomas pueden incluir

Una tos ladradora. La tos es a menudo comparada con el sonido que hace una foca

Una voz rasposa, y ronca

Un sonido duro cuando respiran asía dentro

Los síntomas a menudo mejoran durante el día y empeoran en la noche. Abecés los niños tienen ataques de tos que los despiertan en medio de la noche durante varias noches seguidas.

¿Cómo se trata la Tos Ferina?

La enfermedad usualmente mejora dentro de 2 a 5 días. Tratamientos en casa usualmente tranquiliza los síntomas de la toz ferina.

Quédese tranquilo y calme a su niño/a. Si su niño/a llora solamente empeora la tos
Respirar aire húmedo ayuda (ejemplos: vapor de la regadera oh un humidificador)



2096 Red Arrow Trail

Madison, WI 53711

608-275-6740

Croup (Tos Ferina)

Aviso de Enfermedad Contagiosa

Asegúrese de que su niño/a tome bastantes líquidos

Si los síntomas de su niño/a no mejoran después de 30 minutos, va a necesitar medicina de su doctor. Porque los ataques ocurren en medio de la noche cuando su doctor no está disponible, tendrán que ir al cuarto de emergencia.