



2096 Red Arrow Trail
Madison, WI 53711
608-275-6740

Impétigo

Aviso de Enfermedad Contagiosa

Estimados Padres:

Es posible que su hijo/a haya sido expuesto a la enfermedad contagiosa **Impétigo** en un salón de clase de Reach Dane/Reach Green en el día _____.

Por favor, revise la información abajo. Si usted tiene cualquier pregunta, o si su hijo/a experimenta síntomas de la enfermedad, por favor hable con el proveedor de salud primaria de su hijo/a o una de las agencias indicadas abajo.

Salud Publica – Madison & Dane County

(608) 266-4821

Departamento de Salud de Green County

(608) 328-9390

¿Qué es el impétigo?

El impétigo es una infección de la piel causado por la bacteria estreptocócica o de estafilococo.

¿Cuáles son los síntomas del impétigo?

El impétigo comienza con un racimo de pequeñas, ampollas rojas que se extienden y rompen durante las primeras 24 horas. El líquido amarillo que drena por las ampollas se seca rápidamente y forma una costra como de color miel. Impétigo normalmente ocurre alrededor de la nariz y la boca, pero también puede ser encontrada en los brazos, piernas y el tronco. Las lesiones usualmente causan comezón, pero no dolor.

¿Cómo contrae uno el impétigo?

La infección de impétigo normalmente se contrae por contacto directo con las secreciones de las lesiones. Una persona infectada que no ha recibido tratamiento propaga la bacteria mientras hay drenaje de las lesiones. Los individuos infectados ya no pueden propagar la infección después de 24 horas de haber comenzado el tratamiento con antibióticos.

Después de estar expuesto al impétigo, ¿cuándo comienzan los síntomas?

Los síntomas normalmente comienzan uno a tres días después de estar expuesto a la bacteria estreptocócica; normalmente cuatro a diez días para la bacteria de estafilococo.

¿Cómo se trata el impétigo?

El impétigo se trata con los antibióticos orales o tópicos. Su proveedor de salud le puede avisar sobre las opciones para tratamiento.



2096 Red Arrow Trail
Madison, WI 53711
608-275-6740

Impétigo

Aviso de Enfermedad Contagiosa

¿Por cuánto tiempo se tiene que excluir a un niño con el impétigo del cuidado?

Los niños se tienen que excluir del salón de clases hasta 24 horas después de comenzar el tratamiento con antibióticos tópicos u orales.

¿Cómo puedo evitar la propagación del impétigo?

Todos los niños y adultos deben lavarse las manos frecuentemente con agua tibia y jabón. Las personas con síntomas del impétigo deben buscar atención médica tan pronto como posible. No se debe compartir las toallas, la ropa, y otros artículos personales.