



2096 Red Arrow Trail
Madison, WI 53711
608-275-6740

Virus sincitial respiratorio (RSV)

Aviso de Enfermedad Contagiosa

Estimados Padres:

Es posible que su hijo/a haya sido expuesto a la enfermedad contagiosa **Virus sincitial respiratorio (RSV)** en un salón de clase de Reach Dane/Reach Green en el día

Por favor, revise la información abajo. Si usted tiene cualquier pregunta, o si su hijo/a experimenta síntomas de la enfermedad, por favor hable con el proveedor de salud primaria de su hijo/a o una de las agencias indicadas abajo.

Salud Publica – Madison & Dane County

(608) 266-4821

Departamento de Salud de Green County

(608) 328-9390

¿Qué es la RSV?

RSV es una causa común de las enfermedades respiratorias entre individuos de todas edades. Entre los infantes y niños pequeños, es la causa más común de la bronquitis, la tos ferina, las infecciones de oído, y la neumonía.

¿Cuáles son los síntomas de la RSV?

Los síntomas de la infección de RSV son semejantes a los síntomas de otras infecciones respiratorias. Una persona con una infección de RSV puede experimentar la tos, el estornudo, fiebre, y falta de apetito. También puede experimentar la respiración sibilante o difícil. En los infantes muy jóvenes, los síntomas de irritabilidad, la actividad disminuida, y dificultades con respirar pueden ser los únicos síntomas. La mayoría de los infantes saludables que tienen una infección de RSV no tienen que ir al hospital.

¿Cómo contrae uno la RSV?

El virus se puede contagiar por contacto directo con las secreciones de la nariz o la boca de una persona infectada. Indirectamente, el virus se puede contagiar por las manos de una persona después de tocar un objeto contaminado con gotitas de la nariz o la boca de una persona infectada. La RSV puede permanecer en una superficie por varias horas.

Después de estar expuesto a la RSV, ¿cuándo comienzan los síntomas?

Los síntomas aparecen entre 2 y 8 días después de estar expuesto al virus, normalmente entre 4 y 6 días.

Virus sincitial respiratorio (RSV)

Aviso de Enfermedad Contagiosa

¿Cómo se trata la RSV?

No hay tratamiento específico para las infecciones de RSV. Sin embargo, hay maneras simples para aliviar los síntomas típicos. Su proveedor de salud le puede avisar sobre cómo aliviar los síntomas de los niños con RSV y evaluar si necesitan visitar el hospital.

¿Por cuánto tiempo se tiene que excluir a un niño con RSV del cuidado?

Los niños se tienen que excluir del salón de clases hasta que pasen 24 horas sin fiebre.

¿Cómo puedo evitar la propagación de la RSV?

Es muy importante lavarse las manos regularmente con agua tibia y jabón y desechar de manera higiénico las secreciones orales y nasales de las personas infectadas. Las superficies contaminadas con RSV se deben limpiar con jabón y agua y se deben desinfectar. Los niños con enfermedades respiratorias severas o fiebre no deben asistir el cuidado hasta que se han resuelto.